

In Beispiel 1.1 :

Lösung mit Wert $\sum_{i=1}^n p_i x_i = 46$;

$$x_6 = x_4 = x_{13} = x_{12} = x_9 = x_3 = 1$$

$$x_{15} = 0,6$$

$$x_8 = x_{16} = x_{10} = x_1 = x_{14} = x_5 = x_{11} = x_2 = x_7 = 0$$

Aber: Fractional nicht immer möglich !!

Andere Variante:

PROBLEM 1.6 (Integer Knapsack)

Gegeben : • n Objekte $1, \dots, n$ mit jeweils:

Größe z_i

Gewinn p_i

• Größenschranke Z

Gesucht : Jeweils $x_i \in \mathbb{N}$ mit \leftarrow Vielfachheit

$$\sum_{i \in S} z_i x_i \leq Z$$

$$\sum_{i \in S} p_i x_i \text{ maximal}$$

Spezialfälle!

- Alle Gewinndichten gleich!

PROBLEM 1.7

- Gegeben:
- n Objekte $1, \dots, n$ mit jeweils Größe z_i ($= p_i$!)
 - Größenstranke Z

Gesucht:

$$S \subseteq \{1, \dots, n\} \text{ mit}$$

$$\sum_{i \in S} z_i \leq Z$$

$$\sum_{i \in S} z_i \text{ maximal}$$

Spezialfall davon:

PROBLEM 1.8 ("SUBSET SUM")

- Gegeben:
- n Objekte $1, \dots, n$ mit jeweils Größe z_i
 - Zielgröße Z

Gesucht:

$$S \subseteq \{1, \dots, n\} \text{ mit}$$

$$\sum_{i \in S} z_i = Z$$

Spezialfall davon:

PROBLEM 1.9 ("PARTITION")

Gegeben: n Objekte $1, \dots, n$ mit jeweils Größe z_i ;

Gesucht: $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ mit

$$\sum_{i \in S} z_i = \sum_{i \notin S} z_i$$

1.2 Ein Beispiel

Beispiel 1.10

7, 13, 17, 20, 29, 31, 31, 35, 57

(Man erinnere sich an die allererste AvDI-Vorlesung!)

Gesamtsumme: 240

Also: Gibt es $S \subseteq \{1, \dots, 9\}$ mit $\sum_{i \in S} z_i = 120$?

Antwort: NEIN!

(Danks:

(7, 13, 17, 24, 29, 31, 31, 35, 53)

Wie beweist man die Nichtexistenz?

Ziel: 120

Betrachte: 57 ✓ (o.B.d.A.)



Ziel: 63

Betrachte: 35 ?

Ziel: 28

- Betrachte: 31 x
- 31 x
- 29 x
- 20 ? → 8 x
- 17 ? → 11 x
- 13 ? → 15 x
- 7 ? → 21 x

Geht nicht!




Betrachte: 31 ?

Ziel: 32

- Betrachte: 31 x
- 29 x
- 20 → 12 x
- 17 → 15 x
- 13 x
- 7 x

Geht nicht!




Betrachte: 29 ?

Ziel: 34

- Betrachte: 20 → 14 x
- 17 → 17 x
- 13 x
- 7 x

Geht nicht!



(Alternative: $(35) (31) + (31) = 97$, Ziel 23
geht nicht ...)

Alsoidee:


Ausprobieren, systematisch, von ~~klein~~ größeren zu kleineren Zahlen

↳ Rückwärtsrekursion über verwendete Zahlen und erreichbare Werte!

Vorteil: Funktioniert

Nachteil: Probiert exponentiell viele Teilmengen durch

(Baumdarstellung:



↳ 2^n Knoten!

Verbesserungen:

- Schneide Teilbäume ab wenn möglich
 ↳ z.T. Einsparungen, bleibt aber ^{idR.} exponentiell

Später: "Branch and Bound"

- Betrachte nicht Rückwärtsrekursion
 (d.h. probiere stufenweise aus, reduziere dabei größere Teilinstanzen auf kleinere Teilinstanzen)

Sondern Vorwärtsrekursion:

Bau größere Lösungen aus kleineren Lösungen auf!