Große Übung 27.05.25

A) Zeige: Totality ist nicht semi-entscheidbar.

$$\overline{\text{ACCEPT}_\varepsilon} \not\subseteq \text{TOTALITY}$$

Das Problem: Akzeptiert M_w ε nicht, terminiert M_w möglicherweise nicht.

Betrachte $\overline{\text{ACCEPT}_\varepsilon}$ etwas anders für w :

$$\forall i \in \mathbb{N} : M_w \text{ akzeptiert } \varepsilon \text{ nicht nach } i \text{ Schritten}$$

Betrachte damit Maschine $M_{w'}$ mit $w' = f(w)$, die folgendes für ein Wort $x \in \Sigma^*$ durchfährt.

1. Berechne $i = |x|$
2. Simuliere M_w auf ε für i Schritte
3. Akzeptiert M_w nach i Schritten, gehe in Endlosschleife
4. Ansonsten halte.

Zu zeigen: M_w akzeptiert ε nicht $\Leftrightarrow M_{w'}$ auf jeder Eingabe hält

$w \notin \overline{\text{ACCEPT}_\varepsilon}$, d.h. M_w akzeptiert ε nach $k \in \mathbb{N}$ vielen Schritten.

Dann wird $M_{w'}$ in eine Endlosschleife für Wörter $x \in \Sigma^{2k}$ laufen.

Also ist $w' = f(w) \notin \text{TOTALITY}$.

$w \notin \text{TOTALITY}$, dann kann $M_{w'}$ nur in eine Endlosschleife geraten, wenn für ein $x \in \Sigma^*$ die Simulation von M_w auf ε nach $|x|$ Schritten akzeptiert.

Also ist $M_{w'} \notin \overline{\text{ACCEPT}_\varepsilon}$.

B) Sei $L_n = \{w \mid \exists x \in L(M_w) : \forall y \in \Sigma^{2|x|} : y \in L(M_w)\}$

Zeige oder widerlege: L_n ist (co-) semi-entscheidbar.

Idee: Zeige $\text{TOTALITY} \leq L_n$

Konstruiere M_w' wie folgt:

- M_w' erhält Eingabe $x \in \Sigma^*$
- Für jedes $y \in \Sigma^{\leq |x|}$
 - Simuliere M_w auf y
- Akzeptiere x

Angenommen $w \in \text{TOTALITY}$, dann hält M_w auf jeder Eingabe.

Damit hält die Simulation von M_w in M_w' immer. Auch die anderen Schritte sind endlich $\Rightarrow w' \in L_1$, da $L(M_w') = \Sigma^*$.

Angenommen $w \notin \text{TOTALITY}$, dann existiert $y \in \Sigma^*$ auf dem M_w nicht hält. Damit hält M_w' auf keinem $x \in \Sigma^*$ mit $|x| \geq |y|$, d.h. es gibt kein Wort mehr, ab welchem wir alle größeren Wörter akzeptieren $\Rightarrow w' \notin L_1$.

$L_1' = \{w \mid \exists x \in L(M_w) : \forall y \in \Sigma^{\leq x} : y \in L(M_w)\}$ ist semi-entscheidbar, aber nicht co-semi-entscheidbar.

↳ liegt ϵ in der Sprache?
(hinter diesem Problem liegt im Prinzip ACCEPT_ϵ)

E) $\text{PCP}_{=r}$: wie 0-1-PCP,

gegeben: $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ mit $x_i, y_i \in \{0, 1\}^*$

gesucht: Eine nicht-leere, endliche Sequenz $i_1, \dots, i_n$ mit $n \bmod r = 0$

Zeige: $0-1-PCP \leq PCP_{\equiv r}$

Kacheln bleiben unverändert.

Annahme: $I = i_1 i_2 \dots i_n$ ist eine Lösung für PCP mit

$$n \bmod r = q \in \{0, \dots, r-1\}.$$

$I^r = \underbrace{III \dots I}_{r\text{-mal}}$ ist auch eine Lösung für PCP mit Länge

$r \cdot n$, also $\bmod r = 0$. D.h. $PCP_{\equiv r}$ ist lösbar.

Ist $PCP_{\equiv r}$ lösbar, dann ist diese Lösung auch gültig für PCP.

$PCP_{\leq k}$ wie PCP, nur dass die Lösung höchstens k Kacheln nutzt.
→ ist entscheidbar
→ man muss nur endlich viele Möglichkeiten überprüfen

D) Seien $a, b \in \Sigma^*$ und $L_{a,b} = \{w \mid a \in L(M_w) \text{ und } b \notin L(M_w)\}$

Zeige mit Hilfe des Satzes von Rice über monotone Eigenschaften, dass

$L_{a,b}$ weder semi- noch co-semi-entscheidbar ist.

Betrachte:

$\left. \begin{array}{l} - L_1 = \{a\} \in L_{a,b} \\ - L_2 = \{a,b\} \notin L_{a,b} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Eigenschaft nicht monoton} \\ \Rightarrow \text{nicht semi-entscheidbar} \end{array}$

$\overline{L_{a,b}} = \{w \mid a \notin L(M_w) \text{ oder } b \in L(M_w)\}$

$\left. \begin{array}{l} - L_0 = \{\epsilon\} \in \overline{L_{a,b}} \\ - L_1 = \{\epsilon, a\} \notin \overline{L_{a,b}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \Rightarrow \text{Komplement Eigenschaft ist nicht monoton.} \\ \Rightarrow L_{a,b} \text{ nicht co-semi-entscheidbar} \end{array}$