

Zweites Beispiel für Lösung von Rekursionsgleichungen:
Fibonacci-Zahlen!

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{für } n \geq 2$$

Dafür suchen wir eine geschlossene Form!

Gewöhnliche erzeugende Funktion:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

$$= F_0 x^0 + F_1 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n$$

$$= 0 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n$$

$$= x + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} x^n$$

$$= x + x \sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

$$= x + (x+x^2) \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

$$= x + (x+x^2) F(x)$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

Das kann man weiter zerlegen („Partialbruchzerlegung“): (39)

$$\frac{x}{1-x-x^2} \stackrel{!}{=} \frac{A}{1-ax} - \frac{B}{1-bx} = \frac{A(1-bx) - B(1-ax)}{(1-ax)(1-bx)}$$

Daraus rechnet man:

Nenner: $(1-ax)(1-bx) \stackrel{!}{=} 1-x-x^2$

also $1-(a+b)x+abx^2 \stackrel{!}{=} 1-x-x^2$, d.h. $a+b=1$
 $ab=-1$

Somit $b=(1-a)$ und

$a(a-1)=1$, woraus man
 $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ erhält.

Außerdem $A-B + (-Ab+Ba)x = x$,

Zähler: d.h. $A=B$ und $A = \frac{1}{\sqrt{5}} = B$.

Damit hat man

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}(1-ax)} - \frac{1}{\sqrt{5}(1-bx)} \quad \text{mit}$$

$$a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$
$$b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Wieder mit geometrischen Reihen ist

$$\frac{1}{1-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n \quad \text{und} \quad \frac{1}{1-bx} = \sum_{n=0}^{\infty} b^n x^n,$$

also $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (a^n - b^n)$

Nebenrechnung zur Zerlegung!

Mit den gebräuchlicheren Abkürzungen

$$a = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) =: \varphi \quad (\text{"Goldener Schnitt"})$$

und $b = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) =: \bar{\varphi}$ ergibt sich also

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - \bar{\varphi}^n \right)$$

bzw. (ganz explizit!)

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Erstaunlicherweise liefert das wirklich immer eine ganze Zahl.

Außerdem sieht man, dass die n-te Fibonacci-Zahl der n-ten Potenz des Goldenen Schnittes entspricht - mit dem Korrekturterm $\bar{\varphi}^n$ und um $\frac{1}{\sqrt{5}}$ normiert.

Da $|\bar{\varphi}| < 1$, ist $\left| \frac{\bar{\varphi}^n}{\sqrt{5}} \right| < \frac{1}{2}$, d.h. F_n ist die ganze Zahl, die am nächsten an $\frac{1}{\sqrt{5}} \varphi^n$ ist.

(Das erklärt auch, warum das Verhältnis aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen gegen φ konvergiert!)

5.4.3 Das Master-Theorem

Betrachten wir allgemein

$$T(n) = \sum_{i=1}^m T(\alpha_i \cdot n) + \Theta(n^k)$$

↑
Aufteilung in
Teilprobleme

↑
kosten der aufteilung
+ zusammenfügung

Dafür suchen wir eine allgemeine Formel!

Satz 5.9 (Master-Theorem)

Sei $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$T(n) = \sum_{i=1}^m T(\alpha_i \cdot n) + \Theta(n^k),$$

wobei $\alpha_i \in \mathbb{R} : 0 < \alpha_i < 1, m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{R}.$

Dann gilt

$$T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^k) & \text{für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^k < 1 \\ \Theta(n^k \log n) & \text{für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^k = 1 \\ \Theta(n^c) & \text{mit } \sum_{i=1}^m \alpha_i^c = 1 \text{ für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^k > 1 \end{cases}$$

BEWEIS:

Nicht hier! (Siehe z.B. Cormen, 4.4)

Beispiele 5.10:

(a) $U(n) = 8 U\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$

(Ausprobieren mit $U(1) = 1$:

$U(3) = 8 + 9 = 17$	}	12,76
$U(9) = 8 \cdot 17 + 81 = 217$		
$U(27) = 8 \cdot 217 + 27^2 = 2465$	}	10,66
$U(81) = 8 \cdot 2465 + 81^2 = 26.281$		
$U(243) = 8 \cdot 26.281 + 243^2 = 269.297$	}	10,24
\vdots		

Im Master-Theorem:

$\alpha_1 = \dots = \alpha_8 = \frac{1}{3}$, $m = 8$, $k = 2$

$\sum_{i=1}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 < 1$, also erster Fall :

$U(n) \in \Theta(n^2)$!

$$(b) \quad V(n) = 9 \cdot V\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$

(Ausprobieren mit $V(1) = 1$:

$$V(1) = 1 = 1 \cdot 3^0 = 1 \cdot 1^2$$

$$V(3) = 9 \cdot 1 + 3^2 = 2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 3^2$$

$$V(9) = 9 \cdot (2 \cdot 3^2) + 9^2 = 3 \cdot 3^4 = 3 \cdot 9^2$$

$$V(27) = 9 \cdot (3 \cdot 9^2) + 27^2 = 4 \cdot 3^6 = 4 \cdot 27^2$$

$$V(81) = 9 \cdot (4 \cdot 27^2) + 81^2 = 5 \cdot 3^8 = 5 \cdot 81^2$$

usw.!

Im Master-Theorem:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_9 = \frac{1}{3}, \quad m = 9, \quad k = 2,$$

$$\sum_{i=1}^9 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1, \quad \text{also zweiter Fall:}$$

$$V(n) \in \Theta(n^2 \log n)$$

(c) $W(n) = 10 \cdot W(\frac{n}{3}) + n^2$

(Ausprobieren mit $w(1) = 1$:

$w(1) = 1$	}	19
$w(3) = 10 \cdot 1 + 3^2 = 19$	}	14,26
$w(9) = 10 \cdot 19 + 9^2 = 271$	}	12,69
$w(27) = 10 \cdot 271 + 27^2 = 3439$	}	11,90
$w(81) = 10 \cdot 3439 + 81^2 = 40.951$	}	11,44
$w(243) = 10 \cdot 40.951 + 243^2 = 468.559$	}	

usw.!

Wogegen konvergieren die Quotienten ?!
→ Gegen 10!

Im Master-Theorem:

$\alpha_1 = \dots = \alpha_{10} = \frac{1}{3}$, $m = 10$, $k = 2$,

$\sum_{i=1}^{10} (\frac{1}{3})^2 > 1$, also dritter Fall!

Gesucht wird c mit $\sum_{i=1}^{10} \alpha_i^c = 1$,

d.h. $10 \cdot (\frac{1}{3})^c = 1$

also $(\frac{1}{3})^c = \frac{1}{10}$, oder $c = \log_3 10 \approx 2,096$.

Das liefert $W(n) = \Theta(n^{2,096...})$!