

Zweites Beispiel für Lösung von Rekursionsgleichungen:
Fibonacci-Zahlen!

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{für } n \geq 2$$

Dafür suchen wir eine geschlossene Form!

Gewöhnliche erzeugende Funktion:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \\ &= F_0 x^0 + F_1 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n \\ &= 0 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} x^n \\ &= x + x \sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \\ &= x + (x+x^2) \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \\ &= x + (x+x^2) F(x) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

Das kann man weiter zerlegen („Partialbruchzerlegung“):

$$\frac{x}{1-x-x^2} \stackrel{!}{=} \frac{A}{1-ax} - \frac{B}{1-bx} = \frac{A(1-bx) - B(1-ax)}{(1-ax)(1-bx)}.$$

Daraus rechnet man:

Nenner: $(1-ax)(1-bx) \stackrel{!}{=} 1-x-x^2$,
also $1-(a+b)x+abx^2 \stackrel{!}{=} 1-x-x^2$, d.h. $a+b=1$
 $ab=-1$,

somit $b=(1-a)$ und
 $a(a-1)=1$, woraus man
 $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ erhält.

Außerdem $A-B + (-Ab+Ba)x = x$,

Zähler: d.h. $A=B$ und $A = \frac{1}{\sqrt{5}} = B$.

Damit hat man

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}(1-ax)} - \frac{1}{\sqrt{5}(1-bx)}$$

mit

$$a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Wieder mit geometrischen Reihen ist

$$\frac{1}{1-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n \quad \text{und} \quad \frac{1}{1-bx} = \sum_{n=0}^{\infty} b^n x^n,$$

also $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (a^n - b^n)$

(40)

Mit den gebräuchlicheren Abkürzungen

$$a = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) =: \varphi \quad (\text{"Goldener Schnitt"})$$

und $b = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) =: \bar{\varphi}$ ergibt sich also

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^n - \bar{\varphi}^n \right)$$

bzw. (ganz explizit!)

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

Erstaunlicherweise liefert das wirklich immer eine ganze Zahl.

Außerdem sieht man, dass die n -te Fibonacci-Zahl der n -ten Potenz des Goldenen Schnittes entspricht - mit dem Korrekturterm $\bar{\varphi}^n$ und um $\frac{1}{\sqrt{5}}$ normiert.

Da $|\bar{\varphi}| < 1$, ist $\left| \frac{\bar{\varphi}^n}{\sqrt{5}} \right| < \frac{1}{2}$, d.h. F_n ist

die ganze Zahl, die am nächsten an $\frac{1}{\sqrt{5}} \varphi^n$ ist.

(Das erklärt auch, warum das Verhältnis aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen gegen φ konvergiert!)

S.4.3 Das Master-Theorem

Betrachten wir allgemein

$$T(n) = \sum_{i=1}^m T(\alpha_i \cdot n) + \Theta(n^k)$$

↑ ↑
 Aufteilung in Kosten der Aufteilung
 Teilprobleme + Zusammenfügung

Dafür suchen wir eine allgemeine Formel!

Satz 5.8 (Master-Theorem)

Sei $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$T(n) = \sum_{i=1}^m T(d_i \cdot n) + \Theta(n^k),$$

wobei $\alpha_i \in \mathbb{R} : 0 < \alpha_i < 1 , m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{R}$.

Dann gilt

$$T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^k) & \text{für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^k < 1 \\ \Theta(n^k \log n) & \text{für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^k = 1 \\ \Theta(n^c) \text{ mit } \sum_{i=1}^m \alpha_i^c = 1 & \text{für } \sum_{i=1}^m \alpha_i^c > 1 \end{cases}$$

Beweis:

Nicht hier!

(Siehe z.B. Cormen, 4.4)

Beispiele 5.9:

$$(a) \quad U(n) = 8U\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$

(Ausprobieren mit $U(1) = 1$:

$$U(3) = 8 + 9 = 17 \quad \} \quad 12,76$$

$$U(9) = 8 \cdot 17 + 81 = 217 \quad \} \quad 11,35$$

$$U(27) = 8 \cdot 217 + 27^2 = 2465 \quad \} \quad 10,66$$

$$U(81) = 8 \cdot 2465 + 81^2 = 26281 \quad \} \quad 10,24$$

$$U(243) = 8 \cdot 26281 + 243^2 = 269297$$

:)

In Master-Theorem:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_8 = \frac{1}{3}, \quad m=8, \quad k=2$$

$$\sum_{i=1}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 < 1, \quad \text{also erster Fall:}$$

$$U(n) \in \Theta(n^2) !$$

$$(b) \quad V(n) = 9 \cdot V\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$

(Ausprobieren mit $V(1) = 1$:)

$$\begin{aligned} V(1) &= 1 & V(1) &= 1 \\ V(3) &= 9 \cdot 1 + 3^2 & = 1 \cdot 3^0 &= 1 \cdot 1^2 \\ &= 9 + 9 & = 2 \cdot 3^2 &= 2 \cdot 3^2 \\ V(9) &= 9 \cdot (2 \cdot 3^2) + 9^2 & = 3 \cdot 3^4 &= 3 \cdot 9^2 \\ &= 9 \cdot 18 + 81 & = 4 \cdot 3^6 &= 4 \cdot 27^2 \\ V(27) &= 9 \cdot (3 \cdot 9^2) + 27^2 & = 5 \cdot 3^8 &= 5 \cdot 81^2 \\ V(81) &= 9 \cdot (4 \cdot 27^2) + 81^2 & & \end{aligned}$$

usw. !)

Im Master-Theorem:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_q < \frac{1}{3}, \quad m = 9, \quad k = 2,$$

$$\sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1, \quad \text{also zweiter Fall:}$$

$$V(n) \in \Theta(n^2 \log n)$$

$$(c) \quad w(n) = 10 \cdot w\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$

(Ausprobieren mit $w(1) = 1$:

$$\begin{aligned} w(1) &= 1 && \} 19 \\ w(3) &= 10 \cdot 1 + 3^2 = 19 && \} 14,26 \\ w(9) &= 10 \cdot 19 + 9^2 = 271 && \} 12,69 \\ w(27) &= 10 \cdot 271 + 27^2 = 3439 && \} 11,90 \\ w(81) &= 10 \cdot 3439 + 81^2 = 40.951 && \} 11,44 \\ w(243) &= 10 \cdot 40.951 + 243^2 = 468.559 \end{aligned}$$

vsu. !
 Wogegen konvergieren die Quotienten ?!
 → Gegen 10 !)

Im Master-Theorem :

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_{10} = \frac{1}{3}, \quad m = 10, \quad k = 2,$$

$$\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1, \quad \text{also dritter Fall!}$$

Gesucht wird c mit $\sum_{i=1}^{10} \alpha_i^c = 1$,

$$\text{d.h. } 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^c = 1, \quad \text{also } \left(\frac{1}{3}\right)^c = \frac{1}{10}, \quad \text{oder } c = \log_3 10 \approx 2,096.$$

Das liefert $w(n) = \Theta(n^{2,096\dots})$!