

Logik für Informatik* Übung 6 vom 08.12.04

(Abgabe bis zum 15.12.2004, 9:45 durch Einwurf in den Übungskasten im vierten Stock des Forumsgebäudes)

Aufgabe 1 (Quantoren):

Welche der folgenden Aussagen sind immer richtig, welche manchmal falsch?

- (a) Wenn eine Aussage $H(x, y)$ für alle x und alle y gilt, so gilt $H(x, y)$ auch für alle y und alle x .
- (b) Wenn es ein x und ein y gibt, die $H(x, y)$ erfüllen, so gibt es auch ein y und ein x , die $H(x, y)$ erfüllen.
- (c) Wenn es zu jedem x ein y gibt, so dass $H(x, y)$ gilt, so gibt es auch ein y so dass für alle x $H(x, y)$ gilt.
- (d) Wenn es ein x gibt, so dass für alle y $H(x, y)$ gilt, so gibt es für alle y ein x , so dass $H(x, y)$ gilt.

(20 Punkte)

Aufgabe 2 (Ausdrücke):

Sei $< A, f, g, R, S, a, b >$ eine Struktur mit den einstelligen Funktionen f und g , den zweistelligen Relationen R und S sowie den Konstanten a und b . Weiter seien

- $\phi_1 = (\exists x \forall y (R(x, a) \rightarrow S(y, b))) \vee (\exists x (f(y) = a))$
- $\phi_2 = (\forall x (x = x)) \rightarrow (q \rightarrow (\forall x (x = x)))$
- $\phi_3 = \exists x ((x = y) \vee (\forall R(a, f(y))))$
- $\phi_4 = \exists x ((\exists y R(a, z)) \rightarrow (\forall z S(z, y)))$
- $\phi_5 = \exists x \forall y S(f(z), g(z)) \wedge (f(R(a, z)) = a)$

- (a) Welche dieser Ausdrücke sind korrekt gebildete Ausdrücke in den Variablen $\{x, y, z\}$?
- (b) Bestimmen Sie alle Atome sowie alle freien und gebundenen Variablen der korrekt gebildeten Ausdrücke aus (a).

(40 Punkte)

*Prädikate für alle!